

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

brachytherapie

met narcose



Verbeeten **Radiotherapie**

U wordt in Instituut Verbeeten behandeld vanwege een gynaecologische tumor. Tijdens het gesprek met uw behandelend arts hebt u uitleg gekregen over uw ziekte en behandeling. In deze folder kunt u alle informatie over de inwendige bestraling (brachytherapie) van een gynaecologische tumor nog eens nalezen.

Inwendige radiotherapie

Bij u worden 1 tot 3 holle buisjes in de vagina geplaatst waarvan 1 buisje in de baarmoeder.

Later wordt het bestralingstoestel op deze buisjes aangesloten. Met een afstandsbediening wordt een radioactieve bron naar het te bestralen weefsel gestuurd.

Het inbrengen van de buisjes gebeurt onder algehele narcose of na het geven van een ruggenprik.

Voorbereiding

Voor uw behandeling is het belangrijk dat u nuchter bent. Daarom mag u op de dag van de behandeling vanaf middernacht niet eten, drinken of roken.

Daarnaast is u een laxeermiddel voorgeschreven. Het is belangrijk dat u dit thuis, voorafgaand aan de behandeling, volgens de instructies gebruikt.

Opname

Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie van afdeling H van het Tweesteden Ziekenhuis. Een verpleegkundige neemt u mee naar uw kamer op de afdeling Inwendige

Bestraling van Instituut Verbeeten. Hier wordt een infuus ingebracht.

Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht. Hier krijgt u de ruggenprik of wordt u voorbereid op de narcose.

De bestraling

Op de operatiekamer brengt de bestralingsarts een blaaskatheter in. Vervolgens worden de buisjes geplaatst.

Met een gynaecologische tampon en pleisters worden de buisjes gefixeerd.

Hierna gaat u naar de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent wordt u opgehaald door de verpleging van afdeling H.

De radiotherapeutisch laborant en de doktersassistent brengen u vervolgens naar de CT-scan. Op basis hiervan wordt een individueel bestralingsplan gemaakt.

Als dit bestralingsplan klaar is, wordt u bestraald.

De bestraling vindt plaats op uw kamer op de afdeling Inwendige Bestraling. De bestraling duurt enkele minuten en is pijnloos. Na de bestraling worden de katheters, slangetjes en buisjes verwijderd.

Na de behandeling

Nadat alles verwijderd is kunt u zich opfrissen en mag u naar huis. Wij raden af om op dat moment zelf auto te rijden.

U krijgt een controle afspraak voor over ongeveer 6 weken thuis gestuurd.

Mogelijke bijwerkingen van de inwendige radiotherapie

Het is mogelijk dat u na de behandeling wat vaginaal bloedverlies opmerkt. Wanneer het vloeien heftig is of langer dan een week duurt kunt u contact opnemen met uw behandelend bestralingsarts in Instituut Verbeeten.

Contact

Als u vragen hebt over de behandeling, kunt u die stellen aan de medewerkers van ons instituut.

U kunt hiervoor, tijdens kantooruren, contact opnemen met **telefoonnummer 013-594 77 77**.



Instituut Verbeeten
Brugstraat 10
5042 SB Tilburg
☐ 013-594 77 77

versie: december 2010