

# GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

## brachytherapie

geen narcose



Verbeeten **Radiotherapie**

U wordt in Instituut Verbeeten behandeld voor gynaecologische kanker. U hebt een gesprek gehad met uw radiotherapeut-oncoloog. In dit gesprek hebt u uitleg gehad over uw ziekte en uw behandeling met inwendige bestraling (brachytherapie) in Instituut Verbeeten. In deze folder staat alle informatie over uw behandeling nog eens voor u op een rijtje.

### **Inwendige radiotherapie**

De radiotherapeut-oncoloog plaatst bij u 1 tot 3 holle buisjes in de vagina. Later sluiten we deze buisjes aan op het bestralingstoestel. Met een afstandsbediening sturen we een radioactieve bron door de holle buisjes naar het te bestralen gebied.

### **Wat moet u zelf thuis doen?**

- De avond vóór elke inwendige bestraling gebruikt u volgens instructie een laxermiddel (Microlax).  
Wat hebt u nodig? .....Microlax tubes á 5 ml.  
U krijgt geen recept voor Microlax. Wij vragen u de Microlax zelf te kopen bij drogist of apotheek.
- U hoeft **niet** nuchter te zijn voor de behandeling.

## **Opname**

Meld u op de dag van de behandeling bij de Informatiebalie in de centrale hal van Instituut Verbeeten Tilburg. De doktersassistent van Polikliniek Radiotherapie loopt met u mee naar uw kamer op de afdeling Inwendige Bestraling.

## **De behandeling**

De doktersassistent brengt u naar de behandelruimte.

Uw radiotherapeut-oncoloog brengt bij u een blaaskatheter in en plaatst de buisjes in de vagina.

De radiotherapeutisch laborant en de doktersassistent brengen u naar de CT-scan. De CT-scan gebruiken wij om uw bestralingsplan te maken. Wanneer het bestralingsplan klaar is gaan wij u bestralen.

De bestraling gebeurt op een kamer op de afdeling Inwendige Bestraling. Deze bestraling duurt enkele minuten en is pijnloos.

Na de bestraling verwijderen we de buisjes en de blaaskatheter.

## **Na de behandeling**

Als de blaaskatheter en de buisjes verwijderd zijn mag u zich opfrissen. Hierna mag u naar huis.

U krijgt een controleafspraak thuis gestuurd.

## **Heeft uw behandeling bijwerkingen?**


Het is mogelijk dat na de behandeling:

- De eerste dag de plasbuis geïrriteerd aanvoelt.
- U wat vaginaal bloedverlies hebt.

Neem contact op met uw radiotherapeut-oncoloog in Instituut Verbeeten als het vloeien heftig is, of als het vloeien langer dan een week duurt.

## **Hebt u vragen?**

Bel met de doktersassistent van Polikliniek Radiotherapie.  
De doktersassistent is maandag tot en met vrijdag bereikbaar  
van 8.45 - 17.00 uur.  
Telefoonnummer: 013 - 594 75 65.



Instituut Verbeeten  
Brugstraat 10  
5042 SB Tilburg  
☎013-594 77 77

[www.verbeeten.nl](http://www.verbeeten.nl)

versie: november 2018